

# OHUKAART

ANORGAANILINE SÖÖBIV VEDELIK, HAPPELINE.

KLASS 8C1

PAKEND: 500 ml plastik pudel. Toote nimetus **“FLOW”**

KASUTAMINE: kanalisatsiooniunnistuste puhastamiseks.

VÄLIMUS.

Värvitu vedelik

OHUD.

Sööbiv. Hoiduda sattumast silma, nahale ja hingamisteedesse. Tuleohtlik. Soojenedes võib plahvatada. Põlemisel eralduvad aarud, gaasid on toksilised ja nende mõju möödub alles mitme tunni järel. Toote reaktsioon veega on aktiivne.

KAITSEVAHENDID.

Respiraator, kaitseprillid, happekindlad saapad, kindad, põll. Käepärast hoida pudel puhast vett silmade loputamiseks.

HÄDAOLUKORRAL (suures koguses) – viivitamatult teavitada politseid või päästeametit. Lülitada välja mootorid. Hoida eemal lahtine tuli. Mitte suitsetada. Märgista ohtlik koht, hoiatada lähedal olijaid. Mitte seista allatuult.

LEKKE JA MAHAVALGUMISE KORRAL

Sulgeda leke kui võimalik. Katmiseks kasuta pinnast või mõnda muud absorbset materjali. Toimetada imendunud materjal ohutusse kohta. Kutsu spetsialistid. Välti suurtes kogustes vedeliku sattumist kanalisatsiooni, kraavi ja keldrisse. Informeeri ametivõime kui vedelik on sattunud kanalisatsiooni-kaevusdesse, imunud pinnasesse või loodusesse. Ära kasuta metallkonteinereid jääkide koristamisel.

TULEKAHJU

Kustutada pulber-, vaht- või süsinikdioksiidkustutiga või liivaga. Ära kunagi kasuta veejuga. Veega võib jahutada põlevaid mahuteid. Ära seisa allatuult.

ESMAABI

Üldjuhised: Võtke saastunud rõivad kohe seljast. Vältige kontakti naha, silmade ja riietega. Kaebuste korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile pakendit, etiketti ja/või ohukaarti.

Sissehingamisel: Rahu, värske õhk, arstiabi.

Kontakt nahaga: Kokkupuutel nahaga peske nahka kohe rohke vee ja seebiga. Ärritusnähtude ilmnemisel pöörduge arsti poole.

Kontakt silmadega: Loputada lahtiste laugudega silmi volava vee all põhjalikult vähemalt 15 minutit.

Neelamisel: Loputage kohe suud ning jooge ohtralt vett, pöörduge arsti poole. Kutsuge oksendamise esile ainult siis, kui seda soovib hädaabitelefoni või arsti. Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist ega püüdke midagi suu kaudu manustada, kui vigastatud isik ei ole teadvusel või tal esinevad krambid.

Märkused arstile: Ravi: sümptomaatiline ravi (mürkainetest vabastamine, vitaalfunktsioonid), spetsiifiline vastumürk teadmata.

TOOTJAPPOOLNE INFORMATSIOON

Klass ADR/RID-GGVS/E: 8 (C1) sööbivus

Kembleri arv: 80

ONU arv: 1830

Ohuklass: II